

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL :

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

50 francs - N° 15

27 mai 1977

DLP-8-6-77119892

VIGNE

Mildiou : Les importantes précipitations locales des 25 et 26 mai rendent nécessaire un nouveau traitement avant le 3 juin (régions de Carcassonne, d'Alès, vallée du Rhône, de Nîmes et de Lunel).

La plus grande vigilance est recommandée dans la lutte contre cette maladie. Si le temps permet à nouveau une meilleure exécution des applications, il conviendra d'effectuer ce deuxième traitement afin de pallier les déficiences du premier effectué parfois dans des conditions délicates. Le but est de protéger les jeunes inflorescences très sensibles et le feuillage. Les risques sont devenus fort importants : apporter les quantités suffisantes de matière active à l'hectare. Surveiller de manière particulière les zones viticoles inondées où la seconde application devra être faite dès que possible.

Botrytis : L'humectation permanente du feuillage (plus de 15 heures de suite) a rendu possible des attaques de botrytis sur grappes et sur feuilles. Il convient de ne pas les confondre avec des attaques de mildiou.

Rappelons que les traitements à des stades précis : en particulier dès la fin floraison sont à effectuer. Un prochain bulletin mentionnera les modalités de cette lutte. Certains produits sont à la fois efficaces contre le mildiou et le botrytis. Ils sont à utiliser, de préférence, actuellement.

Oïdium : L'adjonction de soufre mouillable doit être poursuivie, notamment sur Carignan.

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Tavelures : La lutte contre cette maladie doit être poursuivie avec rigueur. La persistance de l'humidité sur feuilles rend nécessaire de nouvelles applications, justifiées également par suite des forts orages au Sud des Cévennes.

Oïdium : Renouveler la protection sur pommier. Vu la saison, il est raisonnable d'abandonner les produits soufrés et de les remplacer par une des substances suivantes, chinomethionate, dinocap, drazoxolon, méthylthiophanate, pyrazophos ...
Poursuivre l'élimination au sécateur des pousses oïdiées.

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

Anthraxose du cerisier : Un traitement devra être appliqué, après récolte, pour éviter une chute prématurée du feuillage consécutive aux attaques de ce champignon. Les produits conseillés sont : doguadine (80 g m.a./hl), folpel (100 g m.a./hl), manèbe (160 g m.a./hl), oxyquinoléate de cuivre (50 g m.a./hl).

7.2.19

Oïdium : Maintenir la protection, notamment sur pêcher!

CULTURES LEGUMIERES

Alternaria - Mildiou de la tomate : Effectuer à nouveau un traitement, notamment dans les zones "touchées" par les orages.

Utiliser : captafol (160 g m.a./hl), mancozèbe (160 g m.a./hl), manèbe (200 g m.a./hl), propinèbe (210 g m.a./hl).

Les produits cupriques ne sont efficaces que contre le mildiou!

Mildiou de la pomme de terre : Maintenir la protection.

CULTURES ORNEMENTALES

Oïdium perforant du laurier cerise : Les traitements doivent être effectués à intervalles réguliers pour lutter contre cette maladie à l'aide de ditalimphos (50 g m.a./hl), dodémorphe acétate (100 g m.a./hl), soufre micronisé mouillable.

LE CHEF DE CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUDE

Tirage du 27 mai 1977 - 1400 exemplaires